



ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ **61 822 56 03** WIZYTA W GRUDNIU 2014 – **RABAT 20 zł**

WODOROWY TEST ODDECHOWY

*diagnostyka SIBOS -zespołu przerostu bakteryjnego jelita cienkiego,
diagnostyka nietolerancji pokarmowych.*

Diagnostykę nietolerancji pokarmowych z użyciem wodorowych testów oddechowych przeprowadzamy wykorzystując nowoczesne urządzenie **Gastrolyzer Gastro+** do monitorowania zawartości wodoru w wydychanym powietrzu, dzięki czemu można wykryć nieprawidłowe trawienie i/lub złe wchłanianie węglowodanów, a także inne zaburzenia.

Zalety badania:

- Nieinwazyjne, tanie, szybkie i wiarygodne badanie bez konieczności użycia worków na próbki oddechowe.
- Natychmiastowe wyniki bez potrzeby wysyłania próbek do analizy.
- Wyniki potwierdzone klinicznie

Wskazania do wykonania testu:

- **Diagnostyka wzdęć, uczucia pełności w jamie brzusznej**
- **Diagnostyka biegunek**
- **Zespół jelita nadwrażliwego**
- **Pierwotna lub wtórna nietolerancja laktozy**
- **Podejrzenie SIBOS (Small Intestinal Bacterial Overgrowth Syndrome; zespół przerostu bakteryjnego jelita cienkiego)**
- Zaburzenia wchłaniania fruktozy lub nietolerancja fruktozy
- Podejrzenie nietolerancji sorbitolu
- Podejrzenie nietolerancji ksylitolu
- Diagnostyka nietolerancji pokarmowych
- Nietolerancja słodczy lub miodu
- Nietolerancja mleka i przetworów mlecznych
- Nietolerancja czekolady
- Nietolerancja produktów dla diabetyków
- Nietolerancja produktów wysoko przetworzonych lub z etykietą „bez cukru”

Bezwzględne przeciwwskazania do wykonania testu

- Dzieci z wrodzoną nietolerancją fruktozy (HFI – hereditary fructose intolerance)
- Rozpoznana lub podejrzewana poposiłkowa hipoglikemia

Względne przeciwwskazania do wykonania testu:

- Podaż antybiotyków w trakcie ostatnich 4 tygodni
- Kolonoskopia w trakcie 4 ostatnich tygodni
- Radiografia w trakcie 4 ostatnich tygodni
- Ileostomia (z wyjątkiem diagnozy w kierunku SIBOS)



WAŻNE! PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO BADANIA





ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ **61 822 56 03** WIZYTA W GRUDNIU 2014 – **RABAT 20 zł**

Przygotowanie pacjenta do badania:

Pacjent musi być na czczo przez okres 12 godzin (minimum 6 godzin przed badaniem; można pić czystą wodę, bez domieszki cukru ani żadnych dodatków smakowych) przed przystąpieniem do testu, powinien umyć zęby, unikać palenia tytoniu oraz żucia gumy, które mogłoby sfalszować wynik testu. Dzień przed badaniem pacjent nie powinien pić mleka oraz soków owocowych, ostatni posiłek w dniu poprzedzającym badanie powinien być nieobfity oraz optymalnie bez błonnika pokarmowego. W dniu poprzedzającym badanie pacjent nie powinien spożywać następujących produktów: kapusta, cebula, por, fasola, warzywa marynowane. Lekarstwa (z wyjątkiem witamin, środków przeczyszczających oraz antybiotyków) mogą być przyjęte w dniu badania (popić wodą). Pacjenci z protezami – nie powinni używać kleju mocującego w dniu badania. W czasie badania pacjent również nie może nic jeść. W czasie badania pobiera się próbki powietrza wydychanego przez pacjenta, wykonuje się 7 pobrań: na czczo przed podaniem oraz 15,30,45 60 ,90 i 120 minut po podaniu do wypicia roztworu określonego typu cukru (występującego powszechnie w diecie). Pacjenci z dużą nietolerancją cukrów mogą po ich podaniu odczuwać wzdęcia, ból brzucha lub oddawać luźne stolce.

KOSZT BADANIA urządzeniem Gastrolyzer wraz z wizytą lekarską	180 zł
KOSZT WIZYTY LEKARSKIEJ	100 zł

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

